



thewellproject

PrEP para las mujeres

Actualizado: 27 de abril de 2023

Juntos podemos cambiar el curso de la epidemia del VIH...una mujer a la vez.

#unamujeralavez

#thewellproject

www.thewellproject.org



thewellproject

¿Qué es la PrEP?

PrEP es la abreviatura de Profilaxis preexposición (por sus siglas en inglés):



Profilaxis: tomar un medicamento **antes** de estar expuesta a algo con el fin de prevenir la contracción de una enfermedad o afección



thewellproject

¿Qué es la PrEP?

Utilizamos **varios tipos de medicamentos** de esta forma:

- **Tomar medicamentos contra la malaria** cuando viajamos a lugares donde nos podrían picar mosquitos transmisores de malaria
 - Cuando el medicamento está dentro del cuerpo de una persona antes de que a esta la pique un mosquito, dicha persona tiene muchas menos probabilidades de enfermarse por malaria cuando le pica el insecto
- Para las mujeres, **tomar anticonceptivos (pastillas para el control de la natalidad)**
 - Las posibilidades de embarazo se reducen en gran medida cuando los anticonceptivos ya están en el cuerpo de la mujer cuando se expone al semen durante las relaciones sexuales
- PrEP: Las personas que no viven con VIH **toman un medicamento para reducir el riesgo de adquirir el VIH** si están expuestas al virus
- PrEP oral (por la boca) y PrEP inyectable de acción prolongada



thewellproject

¿Cómo se impide la transmisión del VIH con la PrEP?

- Las células CD4 infectadas con VIH se transforman en pequeñas fábricas que producen miles de nuevos virus cada día
 - Los medicamentos contra el VIH actúan bloqueando el virus para impedir que se replique
- Si una mujer VIH negativa ya tiene medicamentos contra el VIH en su torrente sanguíneo cuando está expuesta al VIH, por ejemplo, durante las relaciones sexuales sin condón:
 - El medicamento puede evitar que el virus haga suficientes copias de sí mismo
 - Evita que adquiera el VIH



thewellproject

La PrEP oral diaria

Julio de 2012: Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. aprobó el uso diario de Truvada (fumarato de disoproxilo de tenofovir + emtricitabina o TDF/FTC) como PrEP para adultos sexualmente activos y en riesgo de adquirir el VIH

- Truvada se usa con frecuencia como parte de la combinación de medicamentos para el tratamiento del VIH
- Desde entonces, la FDA ha aprobado Descovy (tenofovir alafenamida más emtricitabina o TAF/FTC) para la PrEP; sólo se ha estudiado en personas asignadas al sexo masculino al nacer (hombres cisgénero; mujeres transgénero)

Junio de 2016: La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus directrices recomendando que la PrEP se ofreciera a todas las personas que tengan un riesgo significativo de adquirir VIH

- La OMS aprueba Truvada para la PrEP oral diaria
- Cada país debe aprobar el medicamento individualmente



thewellproject

La PrEP inyectable de acción prolongada

Diciembre de 2021: La FDA aprobó la forma inyectable de acción prolongada del inhibidor de la integrasa cabotegravir para la PrEP

- Algunas personas no quieren/pueden tomar una píldora diaria
- Apretude (marca estadounidense): 2 inyecciones mensuales; 1 inyección cada 2 meses después
- También puede tomarse como medicación oral para asegurarse de que no se producirán reacciones adversas al medicamento
- Existen preocupaciones sobre su altísimo precio, especialmente en los países con altas tasas de VIH
- El fármaco permanece en el cuerpo durante mucho tiempo después de dejar las inyecciones
 - Estudios: especialmente en el caso de las mujeres
 - Mayor probabilidad de desarrollar resistencia al fármaco si adquiere el VIH después de dejar las inyecciones o saltarse una dosis



thewellproject

¿Se ha demostrado la eficacia de la PrEP?

- **Se ha demostrado su eficacia**
 - La PrEP oral ***cuando se toma diariamente según recetada***
 - Tiene una eficacia de más del 90% contra la transmisión sexual
 - Más del 70% de eficacia contra la transmisión por compartir material de inyección de drogas
 - No fue eficaz entre las mujeres en estudios del sur de África, pero el fármaco no se tomó como se prescribió
 - Muy eficaz como "puente" para parejas serodiferentes hasta que la persona viviendo con VIH tenga una carga viral indetectable
 - I=I: no puede transmitir el VIH por vía sexual si la carga viral es indetectable y está en tratamiento



the**well**project

¿Por qué algunos resultados de las investigaciones no son claros?

Para que las herramientas de prevención (condones, PrEP, etc.) funcionen, tienen que ***ser usadas correctamente y consistentemente***

- Los estudios que han demostrado los beneficios tenían ***índices de adherencia mucho más altos***
- Las razones para no adherirse a un tratamiento, especialmente entre las mujeres, no se entienden totalmente
- Existe una ***necesidad de que las mujeres participen en estudios*** para comprender las barreras a la adherencia



the**well**project

¿Por qué algunos resultados de las investigaciones no son claros?

- Aún no entendemos completamente las razones por las cuales las personas, especialmente las mujeres, tenían niveles bajos de adherencia con tomar la PrEP oral
- Es muy importante hacer más investigaciones para ver cuales temas impactan el interés o la capacidad de las mujeres para tomar medicamentos para la prevención del VIH
- También es importante que las mujeres sepan sobre futuras investigaciones que buscan analizar las preguntas sin respuestas sobre la PrEP y que participen en ellas



thewellproject

Directrices de los CDC para el uso de la PrEP

Diciembre de 2021: Las directrices actualizadas de los CDC animan a los proveedores a informar a ***todas las personas que mantienen relaciones sexuales*** de que la PrEP puede protegerlas de adquirir el VIH, y a ofrecer la PrEP a cualquier persona que la solicite

- Efecto deseado es de reducir el estigma y aumentar la concienciación sobre la PrEP
- La PrEP sólo ha llegado a una pequeña fracción de personas en EE.UU. que podrían necesitarla
 - Los CDC estiman que sólo el 10 por ciento de las mujeres que podrían beneficiarse de la PrEP recibieron la prescripción del fármaco



thewellproject

Directrices de la OMS

Las recomendaciones de la OMS son similares a las pasadas directrices de los CDC, que recomendaban ***considerar la PrEP para las personas VIH negativas que corren un considerable riesgo de contraer el VIH.***

Esto incluye a las personas que:

- Tienen relaciones sexuales con una pareja que vive con VIH
- No utilizan condones regularmente/no conocen el estado del VIH de su(s) pareja(s) sexual(es)
- Tienen un elevado número de parejas sexuales
- Ejercen el trabajo sexual comercial
- Ha tenido recientemente una enfermedad de transmisión sexual bacteriana
- Utilizan drogas inyectables y
 - Comparten equipo de uso de drogas, o
 - Tiene una pareja que se inyecta y que vive con VIH



thewellproject

Cuando NO se recomienda la PrEP

- Algunas razones por las cuales la **PrEP no se recomienda** incluyen
 - No conocer su estado de VIH (es importante que sólo las personas que reciben un resultado de VIH negativo tomen la PrEP)
 - Tener señales o síntomas de infección aguda de VIH
 - Tener una función renal reducida
 - Tener una condición desconocida de hepatitis B y/o de la vacuna contra dicha enfermedad
- La PrEP se debe considerar para personas viviendo en áreas donde el VIH es más común
 - Los CDC ofrecen herramientas y listas para los proveedores



thewellproject

Recomendaciones de los CDC

- Aunque la PrEP está diseñada para ser usada con condones u otras medidas para el sexo seguro:
 - Las mujeres que no pueden o no usan condones pueden considerar usar la PrEP en vez de usar condones
 - Es importante entender los riesgos y beneficios generales de usar la PrEP; considere métodos de protección contra otras ITS
- Todas las personas a las que se les prescriba la PrEP deben tener una prueba de VIH negativa
 - Los CDC recomiendan que las personas tomando la PrEP se realicen una prueba cada 3 meses para confirmar que siguen siendo VIH negativas
- Las personas embarazadas deben hablar con su proveedor sobre la PrEP
 - Especialmente si están en una relación serodiferente
 - La PrEP oral es segura al inicio del embarazo



thewellproject

Debate sobre la PrEP


- Muchas personas creen que es un buen agregado a la caja de herramientas de prevención, pero otras no están de acuerdo

Preocupaciones sobre la PrEP

- Personas VIH negativas posiblemente no se adhieran a tomar el medicamento; la PrEP no resultará eficaz
- La PrEP se usará en lugar de condones u otras medidas de sexo seguro

Ventajas de la PrEP

- La PrEP se puede tomar sin el acuerdo o conocimiento de la pareja sexual



Debate sobre la PrEP

Preocupaciones sobre la PrEP

- Posibles efectos secundarios
 - Más comunes: náusea y vómitos
- Efectos secundarios graves ocasionales con Truvada
- Posibilidad de desarrollar una resistencia a los medicamentos si el VIH se adquiere después del uso inconsistente de la PrEP

Ventajas de la PrEP

- La mayoría de los efectos ocurren entre personas que son nuevas a tomar medicamentos contra el VIH; a menudo desaparecen rápidamente
- No se encontraron efectos secundarios graves durante los estudios de la PrEP
 - Pequeñas disminuciones en la densidad mineral ósea en hombres y mujeres transgénero
 - Pequeña disminución de la función renal



thewellproject

¿Qué significa la PrEP para las mujeres?

Ahora tenemos pruebas de que la PrEP funciona para prevenir el VIH si los medicamentos se toman según lo prescrito, pero ***se debe hacer mucho más trabajo*** antes de que la PrEP se use y acepte ampliamente

- ***Mejorar los sistemas de atención médica*** para que las personas puedan obtener y pagar la PrEP
- Hacer que las pruebas del VIH ***estén más disponibles***
 - solo las personas que saben que son VIH negativas pueden usar la PrEP de forma segura



thewellproject

¿Qué significa la PrEP para las mujeres?

Las mujeres pueden usar la PrEP para ***prevenir la adquisición del VIH con o sin la cooperación de sus parejas***

- Importante si la violencia de pareja íntima es un factor
 - La mujer puede temer la violencia de su pareja si le pide que use condones
- Quedan muchas preguntas:
 - ¿Podrán las mujeres conservar los medicamentos PrEP que reciben?
 - A algunas mujeres les preocupa que sus medicamentos podrían ser retirados y entregados a otro miembro de la familia que se considere que "los necesita más"



thewellproject

¿Está considerando tomar la PrEP?

Preguntas para discutir con tu proveedor:

- ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo necesito tomar la PrEP? ¿Qué ocurre si me olvido de tomar una dosis o varias?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios probables y cómo puedo manejarlos?
- ¿Con qué frecuencia debo realizarme un análisis de VIH?
- ¿Cuánto me costará el medicamento?
 - ¿Mi seguro de salud lo cubrirá?
 - ¿Mi seguro de salud cubrirá también los análisis de VIH?



thewellproject

¿Está considerando tomar la PrEP?

Más preguntas para discutir con tu proveedor:

- ¿Algunos de mis estados de salud actuales hacen que la PrEP no sea una buena opción?
- ¿Algunos de mis otros medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, drogas callejeras, hierbas, vitaminas o suplementos tienen interacciones con la PrEP?
- ¿Qué debo hacer si quedo embarazada mientras estoy tomando la PrEP?

¡La PrEP no protege contra otras infecciones de transmisión sexual!



thewellproject

Nuevos desarrollos en el ámbito de la PrEP

- Maraviroc
 - Aprobado para el tratamiento del VIH; existe un estudio continuo sobre la PrEP
- Lenacapavir
 - Forma de PrEP de acción muy prolongada (1 inyección cada 6 meses)
 - Se espera que el estudio finalice en 2027
- Dapivirina
 - Anillo vaginal aprobado en Sudáfrica y otros países
 - No está aprobado en EE.UU.



thewellproject

¡Aprenda más!

- Para aprender más sobre este tema y para enlaces con más detalles, favor de leer la hoja informativa completa:
 - [PrEP para las mujeres](#)
- Para más hojas informativas o para conectarse a nuestra comunidad de mujeres viviendo con VIH, visite:
 - www.thewellproject.org
 - www.facebook.com/thewellproject
 - www.twitter.com/thewellproject